

2023 年临床执业第一单元考生回忆真题试卷

温馨提示:

题目源自考生回忆,内容的进一步完善还需要大家的积极参与,若有不同建议及补充请联系身边的金英杰老师,我们会根据大家的反馈综合评估后进行实时修订,祝大家顺利拿证!

1. 八个月婴儿可出现的体征是

- A . 颈项强直
- B . 双侧巴氏征阳性
- C . 克氏征阳性
- D . 拥抱反射
- E . 吮吸反射

答案: 正确答案 B

2. 关于颅底骨折不正确的是

- A . CT 无法显示颅底骨折
- B . 颅前窝骨折可有“熊猫征”
- C . 单纯性颅底骨折可保守治疗
- D . X 线显示颅内积气
- E . 可有脑脊液流出

答案: 正确答案 A

3. 下列描述女性生殖系统防御机制不正确是

- A . 阴道前后壁紧贴
- B . PH >6.5
- C . 阴道有自净功能

- D . 宫颈内口闭合
- E . 大小阴唇自然合拢

答案：正确答案 B

4. 小儿头围测量的方法是

- A . 沿乳头下缘水平绕胸 1 周
- B . 沿乳头上缘水平绕胸 1 周
- C . 眉弓到耳上到枕后结节绕头一周
- D . 眉间到枕后绕头 1 周
- E . 眉弓上方最突出处到枕后结节绕头 1 周

答案：正确答案 E

5. 鉴别三种非典型苯丙酮尿症的方法是

- A . 尿三氯化铁试验
- B . 尿蝶呤图谱分析
- C . 血浆游离氨基酸分析
- D . Guthrie 细菌生长抑制试验
- E . DNA 分析

答案：正确答案 B

6. 脊髓半切综合征常见于

- A . 急性髓外硬膜内脓肿
- B . 急性脊髓炎

- C . 吉兰巴雷综合症
- D . 脊髓外硬膜下肿瘤
- E . 脊髓空洞症

答案：正确答案 D

7. 婴儿，7个月内，还没接种的疫苗为

- A . 麻腮风疫苗
- B . 脊髓灰质炎疫苗
- C . 乙肝疫苗
- D . 百白破疫苗
- E . 卡介苗

答案：正确答案 A

8. 儿童生长发育特点正确的是
- A . 各个系统生长发育速度一致
 - B . 机体发育不存在个体差异
 - C . 年纪越大，发育越慢
 - D . 婴儿期是体格发育最快的时期
 - E . 各个过程发育均匀一致

答案：正确答案 D

9. 脑栓塞最常见的病因是

- A . 心房颤动
- B . 动脉粥样硬化
- C . 高血压
- D . 糖尿病
- E . 高脂血症

答案：正确答案 A

10. 维持子宫前倾的韧带是

- A . 子宫圆韧带
- B . 子宫阔韧带
- C . 子宫主韧带
- D . 卵巢固有韧带
- E . 卵巢悬韧带

答案：正确答案 A

11. 儿童阶段发病率及死亡率最高的时期是

- A . 新生儿期
- B . 婴儿期

- C . 幼儿期
- D . 学龄前期
- E . 学龄期

答案：正确答案 A

12. 可引起差异性青紫的是哪种先天性心脏病

- A . 动脉导管未闭
- B . 室间隔缺损
- C . 房间隔缺损
- D . 法洛四联症
- E . 肺动脉狭窄

答案：正确答案 A

13. 抑郁症的躯体症状群包括

- A . 情绪低落
- B . 睡眠障碍
- C . 思维迟缓
- D . 动作缓慢
- E . 自责罪

答案：正确答案 B

14. 以下最能提示早期妊娠的是

- A . 超声发现原始心管搏动
- B . 宫颈粘液涂片发现羊齿状树叶结晶
- C . 停经
- D . 双相体温高温相持续 18 天
- E . 尿妊娠试验

答案：正确答案 A

15. 子宫肌瘤最常见的变性是

- A . 囊性变
- B . 玻璃样变
- C . 红色样变
- D . 钙化
- E . 肉瘤样变

答案：正确答案 B

16. 下列不属于新生儿特殊生理性改变的是

- A . 乳房增大

- B . 马牙
- C . 假月经
- D . 生理性黄疸
- E . 红臀

答案：正确答案 E

17. 有关咳嗽变异型哮喘说法正确的是

- A . 常在午后发生或加重
- B . 抗哮喘治疗无效
- C . 以干咳为主
- D . 支气管激发实验阳性
- E . 常发生感染，抗生素治疗有效

答案：正确答案 C

18. 应行预防性宫颈环扎术的是 A . 曾有 3 次以上药物流产史的孕妇

B . 曾有 3 次以上人工流产史的孕妇 C . 曾有 3 次以上稽留流产史的孕妇 D . 曾有 3 次以上足月胎膜早破史的孕妇 E . 曾有 3 次以上妊娠中期自然流产史的孕妇

答案：正确答案 E

19. 单纯母乳喂养易导致婴儿产生的贫血是

- A . 缺铁性贫血
- B . 营养性巨红细胞性贫血
- C . 失血性贫血
- D . 溶血性贫血
- E . 再生障碍性贫血

答案：正确答案 B

20. 闭合性颅盖骨骨折诊断的主要依据是

- A . 触诊局部有凹陷感
- B . 出现神经系统损伤体征
- C . 头皮肿胀有波动感
- D . X 线平片
- E . 有骨擦音

答案：正确答案 D

21. 深感觉障碍，双脚并拢，以下那种情况容易发生跌倒

- A . 双手平举上肢平抬
- B . 闭目
- C . 伸直双臂
- D . 转颈
- E . 屈膝

答案：正确答案 B

22. 合并前列腺增生的帕金森患者不选用的药物是

- A . 溴隐亭
- B . 多巴丝肼
- C . 苯海拉明
- D . 苯海索
- E . 金刚烷胺

答案：正确答案 D

23. 卵巢上皮性肿瘤一线化疗方案为

- A . 博来霉素+长春新碱
- B . 顺铂+长春新碱
- C . 顺铂+长春新碱+异环磷酰胺
- D . 博来霉素+依托泊苷+顺铂

E . 紫杉醇+卡铂

答案：正确答案 E

24. 对自己精神状态认识和判断的能力

A . 自知力

B . 智力

C . 领悟力

D . 意识

E . 定向力

答案：正确答案 A

25. 预防宫颈管套扎的指征

A . 妊娠 24 周

B . 妊娠 9 周

C . 妊娠 32 周

D . 习惯性流产 3 次

E . 妊娠 34 周

答案：正确答案 D

26. 命令性幻听最常见于

- A . 精神分裂症
- B . 惊恐障碍
- C . 躁狂症
- D . 抑郁症
- E . 适应障碍

答案：正确答案 A

27. 长期大量饮白酒后，突然停酒多长时间发生震颤谵妄

- A . 12h
- B . 48h
- C . 6h
- D . 3h
- E . 24h

答案：正确答案 B

28. 患儿，出现便秘，以下哪种治疗方法不正确？

- A . 蒙脱石散
- B . 乳果糖

- C . 布拉氏酵母菌
- . 复方嗜酸乳酸杆菌
- e . 西沙必利

答案：正确答案 A

29. 关于受精过程以下说法正确的是

- A . 卵子排出即可受精
- B . 精子进入输卵管即可成功受精
- C . 受精成功即为妊娠的开始
- D . 整个受精过程需要大概 72h
- E . 受精发生在卵子排出 48h 内

答案：正确答案 E

30. 嵌顿性肩先露通常不引起

- A . 病理性缩复环
- B . 宫腔内感染
- C . 脐带脱垂
- D . 胎盘早剥
- E . 胎死宫内

答案：正确答案 D

31. 妊娠合并什么疾病时还可以继续妊娠

- A . 窦性心律不齐
- B . 房性期前收缩
- C . 室性期前收缩
- D . 房颤
- E . 三度房室传导阻滞

答案：正确答案 A

A2 型题，每小题 1 分，共 69 分

32. 男，62 岁，早晨起床发现右上肢无法抬举、无法独立行走 3 小时，伴言语含糊。发病前晚八点时正常，既往高血压、糖尿病。查体：P90 次 / 分、R19 次 / 分、BP160/90mmHg，神清，言语含糊，右侧鼻唇沟浅，舌头右偏，右上肢肌力二级，右下肢三级，左侧五级，右侧病理征阳性，右侧偏身针刺下降，血糖 11mmol/ L ，SpO₂99%，头颅 CT 正常，诊断考虑为

- A . TIA
- B . 脑血栓形成
- C . 脑栓塞
- D . 脊髓炎

E . 脑出血

答案：正确答案 B

33. 女婴，6个月，热退后皮疹半天。查体：体温 36.9℃，脉搏 120 次 / 分，呼吸 36 次 / 分，精神好，颈部，胸部，上肢可见红色斑丘疹，压之褪色，咽部充血。心、肺、腹及神经系统正常。诊断考虑为

A . 幼儿急疹

B . 风疹

C . 水痘

D . 麻疹

E . 猩红热

答案：正确答案 A



34. 8岁，患重症再生障碍性贫血1月，等待造血干细胞移植，需要纠正贫血时宜输注何种血液制品

A . 辐照的去白的红细胞

- B . 去白红细胞
- C . 悬浮红细胞
- D . 浓缩红细胞
- E . 全血

答案：正确答案 A

35. 初产妇，25岁。顺产后10天，血性恶露持续不断。入院前3小时突发阴道流血增多，约250ml。产科检查：宫底于耻骨联合上2横指，轻压痛，宫颈容2指，有血块及烂肉样物堵塞。不恰当的治疗措施是

- A . 产钳夹除
- B . 补液支持
- C . 抗感染治疗
- D . 给缩宫素
- E . 负压吸引

答案：正确答案 A

36. 女性，35岁，下腹痛伴恶心4小时，无阴道流血，呕吐和发热，平素月经周期正常，末次月经半月前，妇科查体右侧附件区一肿物，5cm，有张力，无触痛。血常规：

HB110g/L \diamond WBC 10×10^9 /L, plt 20×10^9 /L , 血 HCG (-), 最可能的诊断是

- A . 急性阑尾炎
- B . 卵巢肿瘤蒂扭转
- C . 黄体破裂
- D . 盆腔炎性疾病
- E . 子宫内膜异位症

答案: 正确答案 B

37. 女, 30 岁, 妊娠 25 周。 OGTT 实验: 空腹血糖 5mmol/L , 1 小时 11.2mmol/L , 2 小时 8.2mmol/L 。既往体健。该母儿可能的情况是

- A . 妊娠期高血压
- B . 新生儿高血糖
- C . 滴虫阴道炎
- D . 羊水过少
- E . 前置胎盘

答案: 正确答案 A

38. 男孩, 6 岁。水肿, 尿少 5 天。查体: T 37°C , P82 次 / 分, R18

次 / 分，BP100/65mmHg。双下肢凹陷性水肿。实验室检查：血清白蛋白 24g/ L ，胆固醇 6.3mmol/ L ，尿 RBC1~2/HP, 24 小时尿蛋白定量 1.5g。予泼尼松 2mg/ kg . d 口服三周，查 2 次尿蛋白阴性，接下来的治疗措施

- A . 继续泼尼松 2mg/(kg . d), 4 周后改为泼尼松 2mg/ kg 隔日顿服
- B . 继续泼尼松 2mg/(kg . d), 5 周后改为泼尼松 2mg/ kg 隔日顿服
- C . 改为泼尼松 2mg/ kg 隔日顿服
- D . 继续泼尼松 2mg/(kg . d), 2 周后改为泼尼松 2mg/ kg 隔日顿服
- E . 停用泼尼松

答案：正确答案 D

39. 女，39 岁，G3P2，子宫二度脱垂伴阴道前后壁轻度膨出。妇科检查：宫颈长约 6 厘米，子宫后位正常大小，双附件区未触及肿物，要求手术治疗，首选的手术方式是

- A . 次全子宫切除术
- B . 低韧带缩短术
- C . 阴道前后壁修补术
- D . 阴道半封闭术

E . 曼氏手术

答案：正确答案 E

40. 女性，32岁，继发性不孕3年，诊断为双侧输卵管堵塞。2天前行输卵管疏通术后，发热，宫颈举痛，附件压痛，右侧为重，白细胞升高，可能并发什么疾病

- A . 盆腔炎
- B . 子宫剥脱
- C . 黄体破裂
- D . 子宫破裂
- E . 卵巢囊肿

答案：正确答案 A

41. 女，41岁，反复外阴阴道瘙痒3月，既往糖尿病病史6年，妇科查体：阴道红肿，分泌物增多，分泌物呈豆腐渣样。最有可能的诊断是

- A . 外阴阴道假丝酵母菌阴道炎
- B . 滴虫性阴道炎
- C . 萎缩性阴道炎
- D . 细菌性阴道炎
- E . 前庭大腺炎

答案：正确答案 A

42. 男孩，两岁半，重度营养不良，近一周出现腹泻，约 3~8 次 / 日，稀薄，呈黄色，泡沫较多，脓性，可见豆渣样细块，可能诊断的疾病是

- A . 白色念珠菌肠炎
- B . 致病大肠埃细菌肠炎
- C . 轮状病毒肠炎
- D . 金黄色葡萄球菌肠炎
- E . 耶尔森菌小肠结肠炎

答案：正确答案 A

43. 女性，24 岁，月经 21-23 天 / 4-5 天，自然流产 1 次，基础体温双相型，月经第 3 天激素测定未见明显异常，诊断为

- A . 多囊卵巢综合征
- B . 黄体功能不足
- C . 子宫异常内膜脱落
- D . 无排卵性异常子宫出血
- E . 闭经溢乳综合征

答案：正确答案 B

45. 女, 51 岁, 6 周前亲眼目睹丈夫被汽车碾压至死, 近 2 周出现恐惧失眠, 反复回忆起丈夫去世的场景, 不敢进卧室, 最有可能的诊断是

- A . 躯体形式障碍
- B . 创伤后应激障碍
- C . 惊恐障碍
- D . 急性应激障碍
- E . 广泛性焦虑障碍

答案: 正确答案 B

44. 男, 60 岁。近 3 天夜间行为紊乱, 说房间地板上有老鼠、蛇, 能看见死人, 表情恐怖、紧张, 不认识家人, 白天较安静, 喜卧床, 不能回忆夜间行为, 能认识家人, 头部 CT 示: 顶枕叶片状梗死灶, 考虑患者处于

- A . 谵妄状态
- B . 幻觉妄想状态
- C . 抑郁状态
- D . 痴呆状态
- E . 木僵状态

答案：正确答案 A

46. 男, 25 岁, 头痛 4 个月。加重 3 周, 喷射状呕吐。查体: T36°C, P50 次 / 分, R15 次 / 分, BP160/95mmHg, 神志清楚, 无双侧视神经乳头状水肿, 该患者最恰当的处理是

- A . 胸部 X 线+止痛剂
- B . 心电图+止痛剂
- C . 颅脑 B 超+甘露醇
- D . 颅脑 CT / MRI +甘露醇
- E . 腰椎穿刺+甘露醇

答案：正确答案 D

47. 男性, 78 岁, 因睡眠差、食欲极度减退、消瘦明显 2 个月入院, 患者高血压病史 20 余年, 2 年前发现血糖轻度升高, 服用降压降糖药后, 血糖血压控制良好, 患者自主言语减少, 担忧自己去世后老伴无人照顾, 住院期间, 经常夜间突然自主起床活动, 无目的摸床, 严重会大喊大叫, 不认人, 不知道自己身在何处, 猜疑子女拿自己值钱的物品, 时而发脾气, 白天安静睡觉, 记不得夜间发生的事, 患者可能的诊断是

- A . 谵妄
- B . 阿尔兹海默症

- C . 血管性痴呆
- D . 突发性躁狂
- E . 精神分裂

答案：正确答案 C

48. 男 25 岁，尿道刺痛流脓 3 天，查体，尿道口红肿，有黄色脓性分泌物，涂片见多核细胞，可找到革兰氏阴性双球菌，不属于致病原是

- A . 内毒素
- B . 外毒素
- C . 外膜蛋白
- D . 菌毛
- E . 外膜脂多糖

答案：正确答案 B

49. 初产妇，28 岁，妊娠 40 周，估计胎儿 3000g，骨盆测量正常，第一产顺利，宫口开 1 小时， $S = +2$ ，宫缩 4 次 / 10 分，羊水清，胎心变异好，偶有早期减速，应采取的处置是

- A . 密切观察胎头下降情况
- B . 会阴侧并加腹压

- C . 立即剖宫产
- D . 侧切下胎头吸引
- E . 产钳助产

答案：正确答案 A

50. 男，14岁，感冒发热10天，体温高达39.8℃，经医院治疗3天后体温恢复，出院后无明显诱因的讲话少，答少问少，在床上大便。查体：T37.9℃, P95次/分，R20次/分，Bp120/72mmHg。以下诊断最可能是

- A . 病毒脑炎
- B . 焦虑障碍
- C . 躯体感染性精神障碍
- D . 精神分裂
- E . 抑郁障碍

答案：正确答案 C

51. 女38岁，妊娠18周，既往生一智力低下儿，后因心脏病夭折，目前需要的检查是 A . 早期唐筛

- B . 中期唐筛
- C . NT
- D . 羊穿染色体

E . 无创 DNA

答案：正确答案 D

52. 男，20岁，大学生，让其自我介绍时说“我今天太阳出来了，红桃 A 是病毒，我女朋友……”

A . 思维奔逸

B . 思维散漫

C . 思维破裂

D . 思维不连贯

E . 精神分裂

答案：正确答案 C

53. 女，32岁，已婚，G₁P₀，经量增多2年，伴头晕乏力1个月，既往月经规律。妇科检查：子宫增大如妊娠3个月大小，子宫前壁触及直径约8厘米突起，质地较硬，最佳处理方法是

A . 子宫肌瘤切除术

B . 子宫动脉栓塞术

C . 次全子宫切除术

D . 药物治疗

E . 高能聚焦超声治疗

答案：正确答案 A

54. 女，月经周期 22~25/3~4 天，电镜下子宫内膜有高度分泌活动，腺上皮细胞增大，胞内有分泌颗粒，间质疏松肿大，提示此时患者子宫内膜处于的月经周期为

- A . 增生早期
- B . 增生晚期
- C . 分泌早期
- D . 分泌晚期
- E . 月经前期

答案：正确答案 D

55. 男性，48 岁，被木棍打击右颞枕部 12 小时，当时意识丧失，约 3 分钟后意识恢复，无恶心呕吐。查体：神志清，言语流利，双侧瞳孔等大等圆，对光反射灵敏，四肢肌力正常。（CT 图片：右侧枕题部可见一双凸镜高密度影），最可能的诊断是

- A . 硬膜下积液
- B . 硬膜外血肿
- C . 硬膜下血肿

D . 硬膜外脓肿

E . 硬膜外积液

答案: 正确答案 B

56. 足月儿, 曾宫内窘迫, 羊水 3 度, 产钳助产, 生后肌张力下降, 无自主呼吸, 最佳处理

A . 气管插管机械通气

B . 胸外按压

C . 气管插管并吸除胎粪

D .

E . 保暖、摆好体位、清理呼吸道、诱发自主呼吸

答案: 正确答案 C

57. 男婴, 5 个月, 咳嗽 3 天, 喘憋 1 天, 查体 37.8°C , P150 次每分, R66 次每分, 精神可, 鼻翼煽动, 口唇轻度发绀, 三凹征阳性, 双肺呼吸相哮鸣音及少许湿啰音, 实验室检查血 WBC $4.0 \times 10^9/\text{L}$, N0.35, L0.65。最可能的诊断是

A . 呼吸道合胞病毒性肺炎

B . 金黄色葡萄球菌肺炎

C . 肺炎链球菌肺炎

D . 支原体肺炎

E . 腺病毒肺炎

答案：正确答案 A

58. 男，12岁，颅 CT 示脑室高密度，脑血管造影示双侧颈内动脉闭塞，颅底异常脑血管网形成，诊断

A . 脑动脉瘤

B . 脑动静脉畸形

C . 脑血管病

D . 脑静脉瘤

E . 脑烟雾病

答案：正确答案 E

59. 患儿，2岁，发热 39.4 摄氏度，3 小时候前突发抽搐一次，后精神良好。拟诊断为

A . 病毒性脑炎

B . 热性惊厥

C . 化脓性脑炎

D . 低钙性惊厥

E . 中毒性脑病

答案：正确答案 B

60. 男婴，3 月龄，儿童保健门诊体检，足月顺产儿，出生体重 3.2kg，身长 50cm，纯母乳喂养，查体：体重 6kg，身长 63cm，无乳牙，关于小儿喂养，正确的是

- A . 继续纯母乳喂养
- B . 在家庭人的食物的基础，从泥状到碎状食物
- C . 可以添加米粉，奶瓶喂养
- D . 可以一次添加 2-3 种辅食
- E . 混合喂养，为将来停止哺乳做准备

答案：正确答案 A

61. 男性患者，近年来记忆力渐差，把虚构的事件填补记忆，不认识家人，不辨方向。有时在深夜看到屋里有人影晃动。饮酒 20 年，每天 250ml。最可能的诊断是

- A . 血管性痴呆
- B . 震颤谵妄
- C . 阿尔兹海默病
- D . 酒精性痴呆
- E . 科萨科夫综合征

答案：正确答案 E

62. 男孩，2岁，纳差，消瘦2个月，伴发育倒退，查体：T 36.5℃，P 120次/分，R 26次/分，贫血貌，颜面轻度水肿，表情呆滞，皮肤黏膜苍白，心肺未见异常，腹软，肝肋下4cm，脾肋下3cm，无颈抵抗，实验室检查，血Hb88g/L，RBC $1.9 \times 10^{12}/L$ ，外周血涂片示RBC大小不等，以大细胞为多。最可能的诊断是

- A . 再生障碍性贫血
- B . 维生素B12缺乏所致营养性巨幼细胞性贫血
- C . 缺铁性贫血
- D . 地中海贫血
- E . 叶酸缺乏所致营养性巨幼细胞性贫血

答案：正确答案 B

63. 女，26岁，1小时前突发腹痛，阴道少量流血，面苍白，脉搏弱，P120次/分，BP160/100mmHg，子宫大于妊娠周期，硬如板状，胎心不清。可诊断为

- A . 先兆早产
- B . 先兆子宫破裂

- C . 羊水栓塞
- D . 盘早剥
- E . 前置胎盘

答案：正确答案 D

64. 男，14岁，反复左侧肢体抽搐1年，每次发作先是左眼睑抽动
◇逐渐波及左颜面肌肉，向左肩，上肢，下肢扩展，每次发作持续
30秒即可自行缓解。在发作时神志清醒，考虑为癫痫，则最大可能
性为哪种发作类型

- A . 继发全面性强直阵挛发作
- B . 肌阵挛发作
- C . 单纯感觉发作
- D . 复杂部分发作
- E . jackson 发作

答案：正确答案 E

65. 新生儿，20天，胎龄42周，出生体重4300g，出生后腹胀，便秘，喂养困难，查体：刺激后反应差，面部和巩膜黄染，心肺未见异常，腹部膨隆，脐疝，四肢肌张力低下，四肢末稍稍凉，血常规：
Hb122g/L，白细胞 $7 \times 10^9/L$, N0.3L0.6, TSH50mU/L，血培养阴

性，最可能的诊断是

- A . 先天性甲状腺功能减退症
- B . 新生儿缺血缺氧性脑病
- C . 新生儿溶血病
- D . 先天性巨结肠
- E . 新生儿败血症

答案：正确答案 A

66. 初产妇，30岁，孕前体检发现房间隔缺损，现妊娠26周，无心慌气短，超声心动图发现房间隔缺损0.6cm²，EF68%。为发现早期心力衰竭，每周孕检一次，开始的孕周应该是

- A . 28周
- B . 30周
- C . 32周
- D . 34周
- E . 36周

答案：正确答案 C

67. 女性，妊娠28周，外阴可见群集鱼子样小丘疹，表面光滑，触摸有颗粒感。醋酸白试验阴性，拟诊断为

- A . 尖锐湿疣
- B . 假性湿疣
- C . 皮脂腺异位
- D . 扁平湿疣
- E . 生殖器鲍温样丘疹病

答案：正确答案 B

68. 女，16岁，进食困难1年。过分关注体重，认为自己胖，拼命节食，多吃就催吐，偶有贪食。过去的一年体重从55kg下降至35kg，闭经，自觉精神良好。身高165cm，无明显异常体征。甲状腺功能：FT3:4.16pg/ mol , FT4:14.69pg/ mol , TSH :14.63IU/ ml

。可能的诊断是

- A . 抑郁障碍
- B . 广泛性焦虑障碍
- C . 神经性厌食
- D . 强迫障碍
- E . 甲状腺功能减退症

答案：正确答案 C

69. 患儿1岁，活动时喜下蹲及被大人抱，体检发现口唇发绀。下列

哪项不正确

- A . 右心房扩大
- B . 右心室扩大
- C . 左心室扩大
- D . 房间隔缺损
- E . 支气管动脉和肺血管侧支循环建立

答案：正确答案 A

70. 男，3岁，多汗乏力1年余，有2次肺炎病史，查体：胸骨左缘2~3肋间闻及3/6级收缩期杂音，肺动脉瓣区第二心音固定分裂，该患儿胸部 X 线心影形态最可能是

- A . 烧瓶状
- B . 靴状
- C . 梨状
- D . 球状
- E . 卵圆状

答案：正确答案 C

71. 男婴，4个月，烦躁多汗，冬季出生，足月顺产，母乳喂养，请

问可能出现下列哪项

- A . 手足镯
- B . 颅骨软化
- C . 方颅
- D . 鸡胸
- E . X , O 型腿

答案: 正确答案 B

72. 男, 35 岁, 右侧耳后疼痛后, 伴口角歪斜, 查体: 右侧鼻唇沟变浅, 右侧额纹消失, Bell 征 (+), 下面可能的诊断是

- A . 脑血管病
- B . 蛛网膜下腔出血
- C . 面神经炎
- D . 吉兰 - 巴雷综合征
- E . 脑脊膜炎

答案: 正确答案 C

73. 妊娠 42 周, 男婴, 出生四周后烦躁声嘶, 喂食情况不好, 脐周膨隆, 没有排便, 肌张力弱, 可能的诊断是

- A . 缺血缺氧性脑病

- B . 先天性巨结肠
- C . 脑出血
- D . 脑梗死
- E . 脓毒血症

答案：正确答案 B

74. 新生儿，15 天，腹胀，3 天未排便，5 天排便，查体：体重 3.2kg，精神欠佳，腹部见静脉，肠鸣音亢进。为明确诊断首选

- A . 直肠肛门镜
- B . 直肠指检
- C . 直肠肛门肌活检
- D . X 线钡剂灌肠
- E . 立位 X 线平片

答案：正确答案 D

75. 男，68 岁，吃饭时突感左侧肢体无力，伴视物重影，既往高血压病史。查体：神志清楚，右侧眼球外斜外展，右侧瞳孔散大，双侧额纹正常，左侧鼻唇沟浅，左侧肢体肌力 1 级，左侧巴彬斯基征阳性，该患者表现符合

- A . 基底动脉尖综合征
- B . 大脑脚综合征
- C . 闭锁综合征
- D . 霍纳征
- E . 延髓腹外侧综合征

答案：正确答案 B

76. 40 岁女性，G4P1，性生活后有出血并有血性白带，宫颈 2/3 面积为粉红色颗粒状，间质浸润 2mm，下一步的操作应该是

- A . 抗炎治疗
- B . 宫颈锥切
- C . 观察随访
- D . 消融治疗
- E . 全子宫切除

答案：正确答案 E

77. 女，31 岁，自然分娩后 1 天，诉下腹部阵发性疼痛。查体：T37.8℃，宫底平脐，质硬，无压痛，阴道少量流血，暗红色，量少于月经量。该患者属于

- A . 产褥感染

- B . 正常产褥
- C . 软产道裂伤
- D . 产后出血
- E . 子宫复旧不良

答案：正确答案 B

78. 女，30岁，结婚3年未避孕未孕，伴下腹坠胀。月经8~9天/26~28天，妇科检查：子宫后位，活动度较差，形状不规则，附件区未触及明显异常。以下检查对诊断价值最小的是

- A . 盆腔 B 超
- B . 基础体温测定
- C . 分段诊刮
- D . 腹部立位片
- E . 子宫输卵管碘油造影

答案：正确答案 D

79. 初产妇，孕39周，子宫测量未见异常，胎心135次/分，先露 S -2，宫高35cm，腹围115cm，出口后矢状径+坐骨结节间径<15cm，下一步的处理是

- A . 剖宫产

- B . 继续观察
- C . 缩宫素
- D . 人工破膜
- E . 引产

答案：正确答案 A

80. 男童 2 岁，诊断为肾病综合征，激素治疗 3 周后尿蛋白转阴，停药 2 周后复发。该情况一年内出现 3 次。该儿童激素依赖类型是 A . 激素依赖型，复发

- B . 激素敏感型，频复发
- C . 激素依赖型，频复发
- D . 激素耐药型，复发
- E . 激素耐药型，频复发

答案：正确答案 C

81. 女，孕 40 周，宫高 35 厘米，腹围 110 厘米，阴道流血一天，妇科检查：宫口开一厘米，双足先露，接下来应该做什么

- A . 经 B 超外旋转
- B . 经阴道内旋转
- C . 自然分娩

D . 静点缩宫素

E . 剖宫产

答案: 正确答案 E

55.

82. 女, 一年零6个月, 发热两天, 拒食, T38.6℃, P138次/分, R38次/分, 颌下淋巴结肿大, 咽充血, 咽腭弓、腭垂、软腭有数个疱疹, 舌面及齿龈有小疱疹, 且部分小疱疹破溃变成溃疡, 心肺腹无异常, 最可能的病原体是

A . EB 病毒

B . 单纯疱疹病毒

C . 白念珠菌

D . 腺病毒

E . 柯萨奇病毒

答案: 正确答案 E

83. 女30岁, 孕38周, 不规律腹痛3小时, 阴道流出暗褐色分泌物, 诊断为

A . 胎盘早剥

B . 前置胎盘

C . 先兆临产

D . 先兆早产

E . 临产

答案：正确答案 C

84. 男，70岁，走路缓慢伴右上肢摆动消失2年，常跌倒，查体：面部呆板，颈肌张力高，右侧肢体肌张力高于左侧，静坐时，右手震颤，四肢肌力5级，腱反射减退，双侧 Babinski 征阴性，其余神经系统检查无异常，头颅 MRI：皮质内2个小的腔隙灶。最可能的诊断是

A . 特发性震颤

B . 帕金森叠加综合征

C . 血管性帕金森综合征

D . 多系统萎缩

E . 帕金森病

答案：正确答案 E

85. 女，30岁，阴道不规则流血20天，咳嗽5天。半年前行人工流产，吸出物见到绒毛组织，妇科检查：子宫如40天妊娠大小，质软，双侧附件区均可触及大小约5cm的囊性包块，胸部 X 线片示双侧中下野多发棉球状阴影。首先考虑的诊断是

- A . 绒癌
- B . 葡萄胎
- C . 侵袭性葡萄胎
- D . 先兆流产
- E . 稽留流产

答案：正确答案 A

86. 患者发现子宫脱垂，不能用手指还纳，治疗方法是

- A . 阴道前后壁修补
- B . 广泛子宫性切除
- C . 宫底低骨韧带缩短
- D . 子宫托
- E . 中药和针灸

答案：正确答案 C

87. 某患者，考虑维生素 B12 缺乏性贫血，若对其进行治疗，以下哪项是正确的

- A . 如果叶酸吸收障碍则静脉滴注叶酸
- B . 如果维生素 B12 吸收不良则肌注维生素 B12 的时间延长
- C . 叶酸不能和抗氧化剂维生素 C 同时口服

D . 因为维生素 B12 会影响叶酸的吸收所以不能一起口服

E . 因为叶酸会促进维生素 B12 的合成所以要先大量口服叶酸

答案：正确答案 B

89. 医生检查问：你在想什么？患者回答：我是学生，三月三桃花开。

A . 思维破裂

B . 思维散漫

C . 强制性思维

D . 音联意联

E . 思维插入

答案：正确答案 A

88. 男孩，2岁，身高 87cm，体重 12.5kg，能双脚跳，会说 2~3 个字的短语，能准确评估该小儿发育情况的是

A . 发育正常，随访

B . 发育迟缓，建议脑电图和智力测试

C . 发育过度，建议饮食指导

D . 发育迟缓，建议内分泌治疗

E . 消瘦，建议加强营养

答案：正确答案 A

90. 患者，男，近3个月来经常思考“人为什么要存在”“历史起源是什么样的”，自己知道思考没有意义，但自己不能控制，为此感到苦恼，坐立不安，主动就诊。患者存在的主要症状是

- A . 强迫思维
- B . 焦虑症状
- C . 恐惧症状
- D . 强迫症状
- E . 惊恐发作

答案：正确答案 A

91. 初孕妇，25岁，妊娠39周，腹痛2天，查体BP130/90mmHg，心率100次/分，下腹拒按，阴道口可见胎儿上肢，胎心音消失，导尿为淡红色，首选的处理措施是

- A . 缩宫素引产
- B . 部宫产
- C . 内转胎位术
- D . 产钳助产
- E . 静滴地西洋

答案：正确答案 B

92. 女，26岁，痛经3年逐渐加重，月经量增多，本次行经10日，血仍未止，2年前因不孕做过输卵管通液治疗，子宫较正常略大，后位，不活动，右侧触及4x4x3cm的大韧性包块与子宫粘连；左侧附件增厚，双宫低韧带均及豆粒大痛性结节，本病首先考虑为

- A . 陈旧性宫外孕
- B . 生殖器结核
- C . 慢性盆腔炎
- D . 子宫内膜异位症
- E . 输卵管卵巢囊肿

答案：正确答案 D

93. 患儿，女，2.5岁。出生后数月逐渐出现青紫，活动后加剧，胸骨左缘第2~4肋间可闻3级喷射性收缩期杂音。X线检查：心脏稍增大心尖圆钝上翘，肺动脉段凹陷，上纵隔增宽，肺门血管影缩，肺野透亮度增加。该患儿最可能的诊断是

- A . 肺动脉瓣狭窄
- B . 室间隔缺损
- C . 房间隔缺损

D . 动脉导管未闭

E . 法洛四联症

答案：正确答案 E

94. 女，25岁，发现右乳肿块两年。无乳房红肿，疼痛，乳头溢液，无发热。查体：双乳外观无明显异常，右乳外上象限可触及大小2.0cmx1.5cm肿块，质地中等，光滑，活动，边界清楚。应如何治疗

A . 局部理疗

B . 密切观察

C . 针灸治疗

D . 手术切除

E . 中药逍遥散

答案：正确答案 B

95. 【95-97】（温馨提示：题目均为考生回忆版，若题干选项答案有补充或修改，欢迎大家在评论区留言，小编会实时修正题目和成绩，医考帮祝同学们顺利通过考试！）

A .

B .

C .

D .

E .

答案：正确答案 A

96. 【95-97】（温馨提示：题目均为考生回忆版，若题干选项答案有补充或修改，欢迎大家在评论区留言，小编会实时修正题目和成绩，医考帮祝同学们顺利通过考试！）

A .

B .

C .

D .

E .

答案：正确答案 A

97. 【95-97】（温馨提示：题目均为考生回忆版，若题干选项答案有补充或修改，欢迎大家在评论区留言，小编会实时修正题目和成绩，医考帮祝同学们顺利通过考试！）

A .

B .

C .

D .

E .

答案：正确答案 A

56.

98. 患者女，GPO, 28 岁，7 月前行人工流产术后闭经，目前表现为肥胖多毛，行雌激素序贯治疗后未有月经，诊断为

A . Turner 综合征

B . 闭经泌乳综合征

C . 多囊卵巢综合征

D . Asherman 综合征

E . sheehan 综合征

答案：正确答案 C

99. 女，31 岁，产褥期。分娩一子后怕自己养不活，继而紧张，早醒，体重下降 5kg, 该女子最恰当的诊断

A . 焦虑障碍

B . 抑郁障碍

C . 精神分裂障碍

D . 人格障碍

E . 心境转换障碍

答案：正确答案 A

100. 男孩，1岁8个月。发热6天，皮疹2天。查体：营养发育好，皮肤可见斑丘疹颈部左侧可触及一直径2cm淋巴结。双眼球结膜充血，无脓性分泌物。口唇充血水肿，舌乳头突出。手足可见硬性水肿，下列治疗措施最合适的是

- A . 大剂量丙种球蛋白
- B . 双密达莫
- C . 糖皮质激素
- D . 抗生素
- E . 小剂量阿司匹林

答案：正确答案 A

A3型题，每小题1分，共40分

101. 经产妇，32岁，孕39周，估算胎儿体重3800g，骨盆外测量正常，规律宫缩15小时，间歇8分钟，持续30秒，宫口开4cm，胎膜已破，LOA，S=-1，心电图I型。以下有可能的是

- A . 子宫协调性乏力
- B . 子宫不协调性乏力
- C . 子宫协调性收缩过强

D . 子宫不协调性收缩过强

E . 腹肌膈肌收缩减弱

答案: 正确答案 A

102. 经产妇, 32 岁, 孕 39 周, 估算胎儿体重 3800g, 骨盆外测量正常, 规律宫缩 15 小时, 间歇 8 分钟, 持续 30 秒, 宫口开 4cm, 胎膜已破, LOA, S₁ = -1, 心电图 I 型。最恰当的治疗措施是

A . 人工破膜

B . 静滴缩宫素

C . 剖宫产

D . 肌注派替啶

E . 肌注地西洋

答案: 正确答案 B

103. 男婴, 6 个月, 腹泻 6 个月, 4~7 次 / 天, 黏稠样便, 无呕吐, 无发热, 食欲尚可, 精神尚可, 出生体重 3.2kg, 现体重 7.1kg, 单纯母乳喂养, 查体: 无脱水样貌, 营养发育正常, 心肺无异常, 腹部肠蠕动, 肠鸣音正常。考虑的诊断是

A . 过敏性腹泻

B . 感染性腹泻

- C . 生理性腹泻
- D . 消化功能紊乱
- E . 轮状病毒性肠炎

答案：正确答案 C

104. 男婴，6个月，腹泻6个月，4~7次/天，黏稠样便，无呕吐，无发热，食欲尚可，精神尚可，出生体重3.2kg，现体重7.1kg，单纯母乳喂养，查体：无脱水样貌，营养发育正常，心肺无异常，腹部肠蠕动，肠鸣音正常。可行处理方法

- A . 减少母乳喂养次数，使用蛋白水解配方奶
- B . 继续母乳喂养逐步由少到多添加米糊，米糊等辅食
- C . 使用止泻药
- D . 使用抗生素
- E . 停止母乳喂养，使用蛋白水解配方奶

答案：正确答案 B

105. 女，38岁，接触性出血1周，月经规律，G3P1，妇科检查：宫颈上唇见1.0cmx0.5cm，糜烂样改变，质脆，触血明显，子宫及双附件未触及异常，三合诊宫旁软。最有助于确诊的检查是

- A . 妇科超声检查

- B . 宫颈染色细胞学检查
- C . 宫颈活组织检查
- D . 人乳头状瘤病毒检查
- E . 阴道分泌物检查

答案：正确答案 C

106. 女，38岁，接触性出血1周，月经规律，G3P1，妇科检查：宫颈上唇见1.0cmx0.5cm，糜烂样改变，质脆，触血明显，子宫及双附件未触及异常，三合诊宫旁软。若该患者确诊为鳞状细胞癌，基底膜下浸润深度2mm，则分期是

- A . IA1
- B . IA2
- C . IIB1
- D . IIB2
- E . IIB3

答案：正确答案 A

107. 女，62岁，G6P4，绝经6年，阴道反复少量流血4个月，糖尿病病史5年。查体：BP160/105mmHg，身高155cm，体重80kg，妇科检查：阴道少量流血，宫颈光滑，子宫正常大小，双侧附件未见异常。

经阴道超声检查：子宫内膜 1.1cm，不规则增厚，其内与相邻肌层内血流丰富。与该病无关的因素是

- A . 多产
- B . 肥胖
- C . 高血压
- D . 绝经延迟
- E . 糖尿病

答案：正确答案 A

108. 女，62岁，G6P4，绝经6年，阴道反少量流血4个月，糖尿病病史5年。查体：BP160/105mmHg◇身高155cm，体重80kg，妇科检查：阴道少量流血，宫颈光滑，子宫正常大小，双侧附件未见异常。阴道超声检查：子宫内膜1.1cm，不规则增厚，其内与相邻肌层内血流丰富。以下适当的手术方法

- A . 广泛性子宫切除+双附件子宫切除+盆腔，腹部动脉淋巴切除术
- B . 大剂量激素治疗
- C . 宫腔镜子宫内膜电极切除术
- D . 筋膜外全子宫切除术+双附件子宫切除术+盆腔，腹部动脉淋巴切除术
- E . 子宫内膜消融术

答案：正确答案 D

109. 女，35岁，反复发作胸闷、心慌半年，再发半小时。平时工作压力大，半年内突发三次胸闷，心慌，呼吸急促，立刻医院急诊就诊，查心电图，肺部CT，心肌酶谱，肺功能检查均未见明显异常，吸氧后症状缓解。半小时前再发胸闷，气促，心慌，手掌麻木，无胸痛，无呕吐，查体：T37.5℃，P87次/分，R24次/分，血压120/70mmHg，紧张面容，听诊未闻及哮鸣音，心律齐，病理征阴性。考虑诊断为

- A . 不稳定心绞痛
- B . 惊恐障碍
- C . 广泛焦虑障碍
- D . 躯体形式障碍
- E . 支气管哮喘

答案：正确答案 B

110. 女，35岁，反复发作胸闷、心慌半年，再发半小时。平时工作压力大，半年内突发三次胸闷，心慌，呼吸急促，立刻医院急诊就诊，查心电图，肺部CT，心肌酶谱，肺功能检查均未见明显异常，吸氧后症状缓解。半小时前再发胸闷，气促，心慌，手掌麻木，无胸痛，

无呕吐，查体：T37.5℃, P87次/分，R24次/分，血压120/70mmHg，紧张面容，听诊未闻及哮鸣音，心律齐，病理征阴性。首选的治疗药物是

- A . 心境稳定剂
- B . 扩血管药
- C . 抗精神病药
- D . 解痉平喘药
- E . 抗抑郁药

答案：正确答案 A

111. 女，35岁，反复发作胸闷、心慌半年，再发半小时。平时工作压力大，半年内突发三次胸闷，心慌，呼吸急促，立刻医院急诊就诊，查心电图，肺部CT，心肌酶谱，肺功能检查均未见明显异常，吸氧后症状缓解。半小时前再发胸闷，气促，心慌，手掌麻木，无胸痛，无呕吐，查体：T37.5℃, P87次/分，R24次/分，血压120/70mmHg，紧张面容，听诊未闻及哮鸣音，心律齐，病理征阴性。药物治疗的时间为

- A . 1周
- B . 1个月
- C . 3个月
- D . 6个月

E .1 年

答案：正确答案 E

112. 男，67 岁，患再生障碍性贫血 5 年，通过输血纠正了贫血症状，近两次输血出现了发热反应，但无腰痛，无血尿。该患者出现的输血发热反应是

- A . 过敏反应
- B . 迟发性溶血性发热
- C . 急性溶血性发热
- D . 非溶血性致热性反应
- E . 受到细菌污染

答案：正确答案 D

113. 男，67 岁，患再生障碍性贫血 5 年，通过输血纠正了贫血症状，近两次输血出现了发热反应，但无腰痛，无血尿。该患者出现输血发热反应的原因是

- A . 存在致热原
- B . 受血者存在同种白细胞和血小板
- C . 与供者血型不合
- D . 血液运输，保存受污染

E . 受血者患有溶血性疾病

答案：正确答案 B

114. 女，50岁，反复肢体抽搐2年，发作时四肢抽搐，伴意识丧失，数分钟后缓解。4个月内类似症状出现3次。查体：T：36℃，血压：140/90mmHg，神志清楚，脑神经检查正常。四肢肌力5级，肌反射对称，病理反射阴性。MRI提示顶叶巨大占位。考虑什么

- A . 脑出血
- B . 脑脓肿
- C . 颅内肿瘤
- D . 静止性震颤
- E . 癫痫

答案：正确答案 C

115. 女，50岁，反复肢体抽搐2年，发作时四肢抽搐，伴意识丧失，数分钟后缓解。4个月内类似症状出现3次。查体：T：36℃，血压：140/90mmHg，神志清楚，脑神经检查正常。四肢肌力5级，肌反射对称，病理反射阴性。MRI提示顶叶巨大占位。下列哪项治疗有效

- A . 手术治疗

- B . 使用镇静剂治疗
- C . 使用激素治疗
- D . 使用扩血管药物治疗
- E . 抗癫痫治疗

答案：正确答案 A

116. 初产妇，21岁，妊娠33周，头晕头痛，视物模糊三天，加重一天。急诊测血压160/110mmHg，尿蛋白(+++)，NST无反应型，既往体健。最可能的诊断

- A . 重度子病前期
- B . 慢性高血压合并子病前期
- C . 妊娠期高血压
- D . 慢性高血压合并妊娠
- E . 子病

答案：正确答案 A

117. 初产妇，21岁，妊娠33周，头晕头痛，视物模糊三天，加重一天。急诊测血压160/110mmHg，尿蛋白(+++)，NST无反应型，既往体健。不适宜使用的药物。

- A . 地西洋

- B . 拉贝洛尔
- C . 地塞米松
- D . 硫酸镁
- E . 硝普钠

答案：正确答案 E

118. 初产妇，35岁，身高150cm，胎儿估重3500g，妊娠38+5周，自然临产20小时，现宫缩间隔1~2分钟，持续40~60s，患者烦躁，疼痛，平脐可见缩复环，子宫下段压痛，胎心监测反复早期减速，宫口近开全，S₁ = +2，最可能的诊断是

- A . 子宫痉挛性缩复环
- B . 活跃期停滞
- C . 高张性子宫乏力
- D . 胎盘早剥
- E . 先兆子宫破裂

答案：正确答案 E

119. 初产妇，35岁，身高150cm，胎儿估重3500g，妊娠38+5周，自然临产20小时，现宫缩间隔1~2分钟，持续40~60s，患者烦躁，疼痛，平脐可见缩复环，子宫下段压痛，胎心监测反复早期减速，宫

口近开全， $S = +2$ ，最适宜的处理是

- A . 剖宫产
- B . 徒手旋转胎头
- C . 加强宫缩
- D . 胎吸引产
- E . 产钳引产

答案：正确答案 A

120. 女，18岁，持续高热3周后入院，查体 $T39^{\circ}\text{C}$ ，心率85次/分，神志清楚，表情淡漠，面色苍白，前胸部可见散在出血点和红斑，脾肋下可触及，首选考虑的诊断为

- A . 疟疾
- B . 伤寒或副伤寒
- C . 流行性脑脊髓膜炎
- D . 流行性出血热
- E . 败血症

答案：正确答案 B

121. 女，18岁，持续高热3周后入院，查体 $T39^{\circ}\text{C}$ ，心率85次/分，

神志清楚，表情淡漠，面色苍白，前胸部可见散在出血点和红斑，脾肋下可触及，为确诊最有意义的检查是

- A . 出血热病毒抗体
- B . 外斐反应
- C . 肥达反应
- D . 血涂片查疟原虫
- E . 血细菌培养

答案：正确答案 E

122. 女，48岁，G2P1，继发性痛经10年，加重4年，近两年口服止痛药效果差，T36.2, P70次/分，R22次/分，心肺未见异常，查体无宫颈举痛，双侧附件区无肿大，子宫后位，子宫大小如孕3个月，质硬、压痛，双附件、盆腔正常。其发病原因可能是

- A . 孕激素长期刺激
- B . 子宫内膜功能层缺陷
- C . 子宫内膜随经血逆流
- D . 雌激素刺激
- E . 子宫内膜基底层侵入肌层

答案：正确答案 E

123. 女, 48 岁, G2P1, 继发性痛经 10 年, 加重 4 年, 近两年口服止痛药效果差, T36.2, P70 次 / 分, R22 次 / 分, 心肺未见异常, 查体无宫颈举痛, 双侧附件区无肿大, 子宫后位, 子宫大小如孕 3 个月, 质硬、压痛, 双附件、盆腔正常。还可能伴哪些症状

- A . 接触性出血
- B . 性交痛
- C . 月经量增多
- D . 尿频
- E . 便秘

答案: 正确答案 C

124. 女, 48 岁, G2P1, 继发性痛经 10 年, 加重 4 年, 近两年口服止痛药效果差, T36.2, P70 次 / 分, R22 次 / 分, 心肺未见异常, 查体无宫颈举痛, 双侧附件区无肿大, 子宫后位, 子宫大小如孕 3 个月, 质硬、压痛, 双附件、盆腔正常。若 Hb85g/ L , 最适合的治疗方法是

- A . 放置左炔诺孕酮宫内缓释系统
- B . 大剂量孕激素
- C . 中药
- D . 手术治疗
- E . 口服避孕药

答案：正确答案 D

125. 男，22岁，3年来无明显诱因出现孤僻，不愿外出与人交往，白天窗帘紧闭，生活懒散，夏天可长达半个月不洗澡，头发很长也不理，头颅CT未见明显异常，精神检查：表情淡漠，话少，否认幻觉，思维贫乏，情感淡漠，自知力差。诊断为

- A . 精神分裂症
- B . 自闭症
- C . 社交焦虑障碍
- D . 分裂型人格障碍
- E . 抑郁症

答案：正确答案 D

126. 男，22岁，3年来无明显诱因出现孤僻，不愿外出与人交往，白天窗帘紧闭，生活懒散，夏天可长达半个月不洗澡，头发很长也不理，头颅CT未见明显异常，精神检查：表情淡漠，话少，否认幻觉，思维贫乏，情感淡漠，自知力差。治疗为

- A . 抗抑郁药物
- B . 心境稳定剂
- C . 精神兴奋剂

D . 抗精神病药物

E . 抗焦虑药物

答案：正确答案 D

127. 男，22岁，3年来无明显诱因出现孤僻，不愿外出与人交往，白天窗帘紧闭，生活懒散，夏天可长达半个月不洗澡，头发很长也不理，头颅CT未见明显异常，精神检查：表情淡漠，话少，否认幻觉，思维贫乏，情感淡漠，自知力差。该患者服用精神药物后，症状明显好转，但出现静不能坐，手抖等症状，下一步的治疗应该是

A . 加量使用该精神药物

B . 改用其他不同机制作用的精神药物

C . 减量使用该精神药物

D . 停用该精神药物

E . 加用苯海索治疗

答案：正确答案 E

128. 女，35岁，G2P1，不规则阴道流血1月余。平素月经不规律，末次月经不详。查体：T36℃，P80次/分，R18次/分，BP100/70mmHg，面色苍白。妇科检查：外阴、阴道及宫颈未见异常，子宫如妊娠4个月大小，质软，双附件未触及异常。超声示子宫大小18cmx10cmx6cm，

宫腔内充满蜂窝状不均质回声。尿 hCG (+), 胸部 CT 未见异常。
无阴道流血, 无咳嗽咳痰, 超声见宫腔少量积液胸部 CT 未见异常。
考虑诊断是

- A . 葡萄胎
- B . 侵蚀性葡萄胎
- C . 绒毛膜癌
- D . PSTT
- E . 胎盘残留

答案: 正确答案 A

129. 女, 35 岁, G2P1, 不规则阴道流血 1 月余。平素月经不规律, 末次月经不详。查体: T36°C, P80 次 / 分, R18 次 / 分, BP100/70mmHg, 面色苍白。妇科检查: 外阴、阴道及宫颈未见异常, 子宫如妊娠 4 个月大小, 质软, 双附件未触及异常。超声示子宫大小 18cmx10cmx6cm, 宫腔内充满蜂窝状不均质回声。尿 hCG (+), 胸部 CT 未见异常。无阴道流血, 无咳嗽咳痰, 超声见宫腔少量积液。下一步首选的处理是

- A . 保胎治疗
- B . 药物流产
- C . 化疗
- D . 腹腔镜探查
- E . 清宫术

答案：正确答案 E

130. 女，35岁，G2P1，不规则阴道流血1月余。平素月经不规律，末次月经不详。查体：T36℃，P80次/分，R18次/分，BP100/70mmHg，面色苍白。妇科检查：外阴、阴道及宫颈未见异常，子宫如妊娠4个月大小，质软，双附件未触及异常。超声示子宫大小18cmx10cmx6cm，宫腔内充满蜂状不均质回声。尿hCG(+)，胸部CT未见异常。患者术后1周复查血hCG2030.0U/L，无阴道流血，无咳嗽咳痰。超声见宫腔少量积液。下一步最正确的处理是

- A .1周后复查 hCG
- B .1周后复查妇科超声
- C .1个月后复查 hCG
- D .1个月后复查妇科超声

答案：正确答案 A

131. 女孩，4岁，发热咳嗽流涕4天，发疹1天，体温39.5℃，心率130次/分，呼吸38次/分，精神萎靡，头颈部出现红疹，疹间皮肤正常，眼结膜充血有分泌物，淋巴结未触及，口腔充血粗糙，心肺正常，肝触及边，脾未触及，血红蛋白115g/L，白细胞6.5x10⁹/L，中性粒细胞0.35，淋巴细胞0.6，血小板261x10⁹/L，最可能的诊断

是

- A . 风疹
- B . 猩红热
- C . 麻疹
- D . 幼儿急疹
- E . 药物疹

答案：正确答案 C

132. 女孩，4岁，发热咳嗽流涕4天，发疹1天，体温39.5℃，心率130次/分，呼吸38次/分，精神萎靡，头颈部出现红疹，疹间皮肤正常，眼结膜充血有分泌物，淋巴结未触及，口腔充血粗糙，心肺正常，肝触及边，脾未触及，血红蛋白115g/L，白细胞 $6.5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.35，淋巴细胞0.6，血小板 $261 \times 10^9/L$ ，最可能的合并症是

- A . 肺炎
- B . 脓气胸
- C . 肺脓肿
- D . 心肌炎
- E . 麻疹脑炎

答案：正确答案 A

133. 女孩，4岁，发热咳嗽流涕4天，发疹1天，体温39.5℃，心率130次/分，呼吸38次/分，精神萎靡，头颈部出现红疹，疹间皮肤正常，眼结膜充血有分泌物，淋巴结未触及，口腔充血粗糙，心肺正常，肝触及边，脾未触及，血红蛋白115g/L，白细胞 $6.5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.35，淋巴细胞0.6，血小板 $261 \times 10^9/L$ 。退热后，双肺呼吸音细湿啰音，最佳处理措施是

- A . 隔离治疗
- B . 抗过敏
- C . 丙种球蛋白
- D . 抗生素
- E . 阿司匹林

答案：正确答案 A

134. 女，44岁。因右乳腺癌行改良根治术。术后病理：右乳浸润性癌，非特殊型，肿瘤大小3cmx2cm，组织学 III 级，ER80%强阳，PR90%强阳，HER2(+)，ki-67 67.50%。腋窝淋巴结(4/16)见癌转移。全身检查其他器官未见转移。雌激素、孕激素受体均(-)。按照 TNM 分期，该患者分期

- A . T₂，NM₁。

- B . T , N2M
- C . T2N, M0
- D . T3N2M0
- E . T2N2M0

答案：正确答案 E

135. 女，44岁。因右乳腺癌行改良根治术。术后病理：右乳浸润性癌，非特殊型，肿瘤大小3cmx2cm，组织学 III 级，ER80%强阳，PR90%强阳，HER2(+)，ki -67.50%。腋窝淋巴结（4/16）见癌转移。全身检查其他器官未见转移。雌激素、孕激素受体均（-）。该患者术后应采取何种综合治疗方案

- A . 化疗+靶向治疗
- B . 化疗+内分泌治疗
- C . 化疗+靶向治疗+内分泌治疗+放疗
- D . 化疗+放疗+内分泌治疗
- E . 化疗+靶向治疗+内分泌治疗

答案：正确答案 C

136. 【136-140】（温馨提示：题目均为考生回忆版，若题干选项答案有补充或修改，欢迎大家在评论区留言，小编会实时修正题目和成

绩，医考帮祝同学们顺利通过考试！)

A .

B .

C .

D .

E .

答案：正确答案 A

137. 【136-140】（温馨提示：题目均为考生回忆版，若题干选项答案有补充或修改，欢迎大家在评论区留言，小编会实时修正题目和成绩，医考帮祝同学们顺利通过考试！)

A .

B .

C .

D .

E .

答案：正确答案 A

138. 【136-140】（温馨提示：题目均为考生回忆版，若题干选项答案有补充或修改，欢迎大家在评论区留言，小编会实时修正题目和成

绩，医考帮祝同学们顺利通过考试！)

A .

B .

C .

D .

E .

答案：正确答案 A

139. 【136-140】（温馨提示：题目均为考生回忆版，若题干选项答案有补充或修改，欢迎大家在评论区留言，小编会实时修正题目和成绩，医考帮祝同学们顺利通过考试！)

A .

B .

C .

D .

E .

答案：正确答案 A

140. 【136-140】（温馨提示：题目均为考生回忆版，若题干选项答案有补充或修改，欢迎大家在评论区留言，小编会实时修正题目和成

绩，医考帮祝同学们顺利通过考试！)

- A .
- B .
- C .
- D .
- E .

答案：正确答案 A

141. 最容易发生感染的流产类型

- A . 稽留流产
- B . 不全流产
- C . 先兆流产
- D . 难免流产
- E . 完全流产

答案：正确答案 B

统计：全部考生作答 0 次，对 0 次，正确率 0%

B1 型题，每小题 1 分，共 10 分

115.

142. 阴道少量流血， B 超提示宫内胎儿存活的是

- A . 稽留流产
- B . 不全流产
- C . 先兆流产
- D . 难免流产
- E . 完全流产

答案：正确答案 C

143. 3 个月以上的婴幼儿容易感染脑膜炎的病原体是

- A . 脑膜炎双球菌+金黄色葡萄球菌
- B . 肺炎链球菌+脑膜炎双球菌
- C . 金黄色葡萄球菌
- D . 大肠埃希菌
- E . 流感嗜血杆菌+肺炎链球菌

答案：正确答案 E

144. 12 岁以上的儿童容易感染脑膜炎最常见的病原体是

- A . 脑膜炎双球菌+金黄色葡萄球菌
- B . 肺炎链球菌+脑膜炎双球菌
- C . 金黄色葡萄球菌
- D . 大肠埃希菌
- E . 流感嗜血杆菌+肺炎链球菌

答案：正确答案 B

145. 新生儿溶血实验室检查结果为

- A . 未结合胆红素升高， Coombs 直接实验阳性
- B . 未结合胆红素轻度升高， Coombs 直接实验和间接实验阴性
- C . 结合胆红素升高， 抗体释放试验阳性
- D . 结合胆红素升高， 肝功能异常
- E . 未结合胆红素增高， 抗体释放实验阴性

答案：正确答案 A

146. TORCH 感染的实验室指标为

- A . 未结合胆红素升高， Coombs 直接实验阳性
- B . 未结合胆红素轻度升高， Coombs 直接实验和间接实验阴性

- C . 结合胆红素升高，抗体释放实验阳性
- D . 结合胆红素升高，肝功能异常
- E . 未结合胆红素增高，抗体释放实验阴性

答案：正确答案 D

147. 女性患者行人工流产术中突发胸闷，冷汗，面色苍白，心动过缓，心律不齐，可能的原因是

- A . Asherman 综合征
- B . 子宫穿孔
- C . 空气栓塞
- D . 人工流产综合征
- E . 吸宫不全

答案：正确答案 D

148. 人工流产术后阴道持续流血 2 周末净，可能的诊断是

- A . Asherman 综合征
- B . 子宫穿孔
- C . 空气栓塞
- D . 人工流产综合征
- E . 吸宫不全

答案：正确答案 E

149. 女，27岁，孕30周，白带增多6天，妇科检查：外阴正常，阴道见浆液性脓性分泌物，宫颈红肿，轻度糜烂，Giemsa染色可见包涵体，该病原体治疗是

- A . 青霉素
- B . 克林霉素
- C . 头孢曲松
- D . 氧氟沙星
- E . 阿奇霉素

答案：正确答案 E

150. 女，32岁，妊娠12周，阴道检查发现大阴唇红肿，可见圆形小溃疡，阴道分泌物检查可见活跃的苍白螺旋体，首选治疗是

- A . 青霉素
- B . 克林霉素
- C . 头孢曲松
- D . 氧氟沙星
- E . 阿奇霉素

答案：正确答案 A

